



**nós cuidamos
de quem você
mais ama**

normas recomendadas



Febre Amarela

A febre amarela é uma doença infecciosa viral aguda, não contagiosa. A transmissão se dá por picada de mosquitos infectados.

A febre amarela silvestre é transmitida pelo mosquito *Haemagogus* e *Sabethes* e a urbana pelo *Aedes aegypti* (o mesmo que transmite a dengue).

Sintomas mais comuns são febre, dor de cabeça, calafrios, náuseas, vômitos, dores no corpo, pele e olhos amarelos e hemorragias de gengivas, nariz, estômago, intestino e urina.

É endêmica na África e nas matas da América do Sul. No continente africano, a doença atinge vários países, inclusive as zonas urbanas. Na América do Sul, é transmitida por mosquitos silvestres.

A vacina é a principal ferramenta de prevenção e controle da doença.

Quem pode se vacinar:

- Rotina para crianças a partir de 9 meses de idade, adolescentes e adultos em áreas endêmicas. Para controle de surto ou situação de alto risco, a vacinação de crianças com idade entre 6 e 8 meses pode ser considerada pelo médico;
- Para viajantes que se dirigem para áreas endêmicas, a partir de 9 meses de idade;
- Há precauções especiais para a administração em indivíduos de 60 anos de idade ou mais (aumento de incidência de eventos adversos severos indesejáveis).

Contraindicações: Mulheres amamentando até que seus bebês completem 6 meses de vida, imunodeprimidos, gestantes, indivíduos com reação de hipersensibilidade ao ovo, proteína de galinha, a qualquer componente da vacina ou hipersensibilidade grave (anafilaxia) após dose anterior de vacina contra a febre amarela.

