



nós cuidamos
de quem você
mais ama

normas recomendadas



Febre Tifóide

A Febre Tifóide é uma doença bacteriana aguda, causada pela *Salmonella Typhi*, que difere da maioria das outras espécies de salmonela por infectar somente seres humanos. Após invadir a parede intestinal e alcançar a circulação sanguínea, a bactéria pode invadir qualquer órgão e multiplicar-se no interior de células de defesa. A presença da bactéria no sangue determina o início dos sintomas.

O modo de transmissão da doença é por via fecal-oral, principalmente através da ingestão de água ou de alimentos contaminados com fezes humanas ou com urina contendo *Salmonella Typhi*. Pode ser transmitida também pelo contato direto (mão-boca) com fezes, urina, secreção respiratória, vômito ou pus de um indivíduo infectado. Este indivíduo pode eliminar a bactéria, nas fezes e na urina, por um período de até 3 meses, independentemente de apresentar os sintomas da doença. Portadores crônicos podem transmiti-la por até um ano.

Doença que se caracteriza por febre alta, dores de cabeça, mal-estar geral, falta de apetite, diarreia e tosse seca, podendo aparecer manchas rosadas no tronco.

A vacinação contra febre tifóide é recomendada para pessoas sujeitas a exposições excepcionais como os trabalhadores quem entram em contato com esgotos, para aqueles que ingressem em zonas de alta endemicidade como por ocasião de viagem, e ainda, para quem vive em áreas onde a incidência é comprovadamente alta.

Quem pode se vacinar: Crianças acima de 2 anos de idade e adultos.

Contraindicações: Hipersensibilidade a algum componente da vacina (anafilaxia).

Esquema de doses: Dose única e, caso o indivíduo permaneça em risco ou volte a se expor ao risco, deve ser feita a revacinação a cada 3 anos.

Reações Adversas: Locais, de intensidade leve e tendem desaparecer espontaneamente em até 48 horas. A ocorrência reações sistêmicas e de anafilaxia é rara.

