Hepatite A

causar este tipo de inflamação, responsável pelo aumento do número de pessoas doentes e as perdas econômicas em todo o mundo.
Os primeiros sinais de infecção são: febre, fadiga, vômito e diarréia. Após 1 ou 2 semanas, o fígado aumenta de tamanho e pode ocorrer icterícia (pele e olhos amarelados). A urina escurece e as fezes ficam claras ou brancas durante o período da icterícia. Em alguns casos, algumas pessoas com hepatite A podem não apresentar sintomas, porém podem continuar infectadas e transmitir os vírus para outras pessoas. A hepatite A tem duração de 3 a 6 semanas, afastando os indivíduos de suas atividades rotineiras, no entanto, em alguns casos os sintomas se prolongam por até 6 meses.
O vírus da Hepatite A se multiplica no fígado e é eliminado pelas fezes. Desta forma, ele normalmente entra no organismo pela boca e é transmitido através de alimentos, água ou objetos contaminados com fezes ou secreções do trato gastrintestinal. O vírus pode ser disseminado pelas mãos de pessoas infectadas por contato direto ou também pela manipulação de objetos contaminados.
A doença não tem tratamento específico. Durante a fase aguda da doença, os indivíduos devem ser afastados da comunidade (creches, escolas, trabalho).
A melhor forma de se prevenir essa doença, é através da vacina contra Hepatite A, em adultos pode ser administrada junto com a vacina contra Hepatite B (Hepatite A+B combinada).

Quem pode se vacinar: Crianças a partir de 1 ano de idade, adultos e idosos.
Contraindicações: Alergia grave (anafilaxia) a um dos componentes da vacina.
Esquema de doses: 2 doses, sendo a segunda 6 meses após a primeira. A escolha da formulação pediátrica ou adulta dependerá da idade do paciente.
Eventos Adversos: Raros (menos de 5%). Reações locais são as mais comuns, até 24 horas após a aplicação.

Apresentações:
Vacina Simples: Vacina Hepatite A adulto e pediátrica
Vacinas Combinadas: Vacina Hepatite A e B.