



nós cuidamos
de quem você
mais ama

normas recomendadas



Pneumocócica

Doenças pneumocócicas são infecções causadas pela bactéria *Streptococcus pneumoniae*, também conhecida como pneumococo.

A doença pneumocócica é complexa e tem múltiplas manifestações, incluindo:

Meningite (inflamação das membranas que envolvem o sistema nervoso central)

Septicemia (infecção generalizada)

Bacteremia (infecção na corrente sanguínea)

Pneumonia (inflamação dos pulmões, geralmente devida a infecção)

Otite Média (inflamação do ouvido, geralmente devida a infecção).

Os sinais e sintomas típicos de pneumonia são tosse produtiva, febre e detecção radiográfica de um infiltrado.

Quem pode se vacinar: A vacina pneumocócica 13-valente protege contra 13 sorogrupos de pneumococos e é licenciada para crianças a partir de 2 meses, adolescentes e adultos. A vacina pneumocócica 10-valente está licenciada para crianças a partir de 2 meses até 5 anos de idade. A vacina pneumo 23 está licenciada para crianças a partir de 2 anos de idade, adultos e idosos.

Contraindicações: Quadro febril agudo ou alergia grave a um dos componentes da vacina.

Esquema de doses:

Pneumo 10 e pneumo 13 – Crianças de 2 a 6 meses de idade: três doses + uma dose de reforço – primeira dose o mais precocemente possível, a partir de 2 meses de vida, segunda dose 2 meses após a primeira, terceira dose 4 meses após a primeira. Reforço entre 15 e 18 meses.

Pneumo 23- Crianças, somente a partir dos 2 anos de idade em dose única. Para adultos a necessidade de um reforço após cinco anos.

Obs: quando a vacinação é iniciada fora desta faixa etária, o esquema de vacinação pode sofrer alterações.

