



nós cuidamos
de quem você
mais ama

normas recomendadas



Rotavírus

É a principal causa de diarreia grave em crianças com até dois anos de idade em todo o mundo, embora possa ocorrer também em adultos.

A transmissão ocorre principalmente por via fecal-oral, pelo contato direto entre as pessoas, por utensílios, brinquedos, água e alimentos contaminados.

Este vírus causa a rotavirose, uma doença diarreica aguda responsável por ocasionar surtos em escolas, berçários, creches e hospitais.

A maioria das infecções acontece em crianças de 6 meses a 2 anos de idade caracterizada por uma forma abrupta de vômito, na maioria das vezes há diarreia aquosa a presença de febre alta, que pode resultar em desidratação.

Existem duas vacinas diferentes contra o rotavírus, com esquemas vacinais diferentes.

Vacina contra rotavírus monovalente (rede pública)- Protege contra o vírus G1, são necessárias duas doses aos dois e quatro meses de idade.

Vacina contra rotavírus pentavalente (particular)- Protege contra os vírus G1, G2, G3, G4 e G9. É administrada em três doses aos dois, quatro e seis meses de idade. A terceira dose não deve passar de 32 semanas.

Em casos de vômitos e regurgitação, não há necessidade de repetir a dose.

